



DIPLÔME NATIONAL DU BREVET

SESSION 2020

MATHÉMATIQUES

SÉRIE GÉNÉRALE

NOUVELLE-CALÉDONIE

14 DÉCEMBRE 2020

Durée de l'épreuve : 2h00

100 points

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il soit complet.
Il comporte 6 pages numérotées de la page 1 sur 6 à la page 6 sur 6.

L'usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé.
L'usage de calculatrice sans mémoire « type collègue » est autorisé.

Exercice n° 1	18 points
Exercice n° 2	8 points
Exercice n° 3	11 points
Exercice n° 4	16 points
Exercice n° 5	7 points
Exercice n° 6	14 points
Exercice n° 7	15 points

Indications portant sur l'ensemble du sujet.

Toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée.

Pour chaque question, si le travail n'est pas terminé, laisser tout de même une trace de la recherche ; elle sera prise en compte dans la notation.

EXERCICE n° 1 — Un QCM à six questions

18 points

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM). Pour chaque question, une seule des trois réponses proposées est exacte.

Sur la copie, indiquer le numéro de la question et la réponse A, B ou C choisie.

Aucune justification n'est demandée.

Aucun point ne sera enlevé en cas de mauvaise réponse.

Propositions		Réponse A	Réponse B	Réponse C
1.	$\frac{5}{3} - \frac{1}{3} \times \frac{3}{2}$ est égal à :	$\frac{2}{3}$	2	$\frac{7}{6}$
2.	L'écriture scientifique de 245×10^{-5} est :	245×5	$2,45 \times 10^{-3}$	$2,45 \times 10^{-7}$
3.	Voici les durées en minutes entre différents arrêts d'une ligne de bus : 3 ; 2 ; 4 ; 3 ; 7 ; 9 ; 7 La durée moyenne en minutes entre les différents arrêts est :	3 min	4 min	5 min
4.	En considérant à nouveau la série statistiques précédente : La durée médiane en minutes entre les différents arrêts est :	3 min	4 min	5 min
5.	Un jeu de 32 cartes comporte 4 rois. On tire au hasard une carte du jeu. Quel est la probabilité d'obtenir un roi.	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{3}{32}$
6.	Une ville située sur l'équateur peut avoir pour coordonnées :	(45°N, 45°E)	(78°N, 0°E)	(0°N, 78°E)

EXERCICE n° 2 — La facture

8 points

Un prix TTC (Toutes Taxes Comprises) s'obtient en ajoutant la taxe appelée TGC (Taxe Générale sur la Consommation) au prix HT (Hors Taxes).

En Nouvelle-Calédonie, il existe quatre taux de TGC selon les cas : 22 %, 11 %, 6 % et 3 %.

Alexis vient de faire réparer sa voiture chez un carrossier.

Voici un extrait de sa facture qui a été tâchée par de la peinture.

Les colonnes B, D et E désignent des prix en francs.

	A	B	C	D	E
1	Référence	Prix HT	TGC (en %)	Montant TGC	Prix TGC
2	Phare avant	64 000	22 %	14 080	78 080
3	Pare choc	18 000	22 %		21 960
4	Peinture	11 700	11 %	1 287	12 987
5	Main d'œuvre	24 000		1 440	25 440
6	TOTAL À RÉGLER				138 467

1. Quel est le Montant TGC pour le pare choc?
2. Quel est le pourcentage de la TGC qui s'applique à la main d'œuvre?
3. La facture a été faite à l'aide d'un tableur.
Quelle formule a été saisie dans la cellule E6 pour obtenir le total à payer?

EXERCICE n° 3 — Programmes de calcul

11 points

On donne les deux programmes de calcul suivants :

Programme A	Programme B
<ul style="list-style-type: none"> — Choisir un nombre; — Soustraire 5 à ce nombre; — Multiplier le résultat par le nombre de départ. 	<ul style="list-style-type: none"> — Choisir un nombre; — Mettre ce nombre au carré; — Soustraire 4 au résultat.

1. Alice choisit le nombre 4 et applique le programme A.
Montrer qu'elle obtiendra -4 .
2. Lucie choisit le nombre -3 et applique le programme B.
Quel résultat va-t-elle obtenir?

Tom souhaite trouver un nombre pour lequel les deux programmes de calculs donneront le même résultat. Il choisit x comme nombre de départ pour les deux programmes.

3. Montrer que le résultat du programme A peut s'écrire $x^2 - 5x$.
4. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme B.
5. Quel est le nombre que Tom cherche?

Toute trace de recherche même non aboutie sera prise en compte dans la notation.


EXERCICE n° 4 — La régates

16 points

Sur la figure suivante, on donne les distances en mètres :
 $AB = 400\text{ m}$, $AC = 300\text{ m}$, $BC = 500\text{ m}$ et $CD = 700\text{ m}$.

Les droites (AE) et (BD) se coupent en C .

Les droites (AB) et (DE) sont parallèles.



1. Calculer la longueur DE .
2. Montrer que le triangle ABC est rectangle.
3. Calculer la mesure de l'angle \widehat{ABC} . Arrondir au degré près.

Lors d'une course les concurrents doivent effectuer plusieurs tours du parcours représenté ci-dessus. Ils partent du point A puis passent par les points B , C , D et E dans cet ordre puis de nouveau par le point C pour ensuite revenir au point A .

Mattéo, le vainqueur, a mis $1\text{ h }48\text{ min}$ pour effectuer 5 tours du parcours. La distance parcourue pour faire un tour est 2880 m .


4. Calculer la distance totale parcourue pour effectuer les 5 tours du parcours.
5. Calculer la vitesse moyenne de Mattéo. Arrondir à l'unité.

EXERCICE n° 5 — La corde

7 points

Le triangle ABC rectangle en B ci-après est tel que $AB = 5\text{ m}$ et $AC = 5,25\text{ m}$.


1. Calculer en mètre la longueur de BC . Arrondir au dixième.



Une corde non élastique de $10,5\text{ m}$ de long est fixée au sol par ses extrémités entre deux poteaux distants de 10 m .

2. Melvin qui mesure $1,55\text{ m}$ pourrait-il passer sous cette corde sans se baisser en la soulevant par le milieu?

Toute trace de recherche même non aboutie sera prise en compte dans la notation.



EXERCICE n° 6 — Les étiquettes

14 points

1. Justifier que le nombre 102 est divisible par 3 .
2. On donne la décomposition en produit de facteurs premiers de 85 : $85 = 5 \times 17$. Décomposer 102 en produit de facteurs premiers.
3. Donner 3 diviseurs non premiers du nombre 102 .

Un libraire dispose d'une feuille cartonnée de $85\text{ cm} \times 102\text{ cm}$. Il souhaite découper dans celle-ci, en utilisant toute la feuille, des étiquettes carrées. Les côtés de ces étiquettes ont tous la même mesure.

4. Les étiquettes peuvent-elles avoir 34 cm de côté? Justifier votre réponse.
5. Le libraire découpe des étiquettes de 17 cm de côté. Combien d'étiquettes pourra-t-il découper dans ce cas?



Nolan souhaite construire une habitation.

Il hésite entre **une case** et **une maison** en forme de prisme droit.

La case est représentée par un cylindre droit d'axe (OO') surmontée par un cône de révolution de sommet S .

Les dimensions sont données sur les figures suivantes.



x représente à la fois le diamètre de la case et la longueur AB du prisme droit.



Partie 1

Dans cette partie, on considère que $x = 6\text{ m}$.

1. Montrer que le volume exact de la partie cylindrique de la case est $18\pi\text{ m}^3$.
2. Calculer le volume de la partie conique. Arrondir à l'unité.
3. En déduire que le volume total de la case est environ 66 m^3 .

Cylindre de rayon r et de hauteur h	Cône de rayon r et de hauteur h
	
<p>Volume = $\pi \times r^2 \times h$</p>	<p>Volume = $\frac{1}{3} \pi \times r^2 \times h$</p>

Partie 2

Dans cette partie, le diamètre est exprimé en mètres, le volume en m^3 .

Sur l'**Annexe**, on a représenté la fonction qui donne le volume total de la case en fonction de son diamètre x .

1. Par lecture graphique, donner une valeur approchée du volume d'une case de 7 m de diamètre.

Tracer en pointillés permettant la lecture.

La fonction qui donne le volume de la maison en forme de prisme droit est définie par $V(x) = 12,5x$.

2. Calculer l'image de 8 par la fonction V .

3. Quel est la nature de la fonction V ?

4. Sur l'**Annexe**, tracer la représentation graphique de la fonction V .

Pour des raisons pratiques, la valeur maximale de x est de 6 m. Nolan souhaite choisir la construction qui lui offrira le plus grand volume.

5. Quelle construction devra-t-il choisir? Justifier.

EXERCICE n° 8 — Scratch

11 points

Le script suivant permet de tracer un carré de côté 50 unités.

1. Sur l'**Annexe**, compléter le script pour obtenir un triangle équilatéral de côté 80 unités.

```
quand [drapeau] est cliqué
s'orienter à 90 degrés
stylo en position d'écriture
répéter 4 fois
  avancer de 50
  tourner de 90 degrés
```

On a lancé le script suivant :


2. Entourer sur l'**Annexe** la figure obtenue avec ce script.

```
quand [drapeau] est cliqué
s'orienter à 90 degrés
mettre longueur à 40
stylo en position d'écriture
répéter 12 fois
  avancer de longueur
  tourner de 90 degrés
  ajouter à longueur 10
```

ANNEXES à rendre avec sa copie


Exercice 7

Partie 2 : Questions 1 et 3.






Exercice 8

Question 1



Question 2



BREVET — 2020 — NOUVELLE-CALÉDONIE — SÉRIE GÉNÉRALE

CORRECTION

Un sujet assez complet qui mélange la plupart des thèmes de troisième.



EXERCICE n° 1 — Un QCM à six questions

18 points

Fractions — Écriture scientifique — Moyenne — Médiane — Probabilités — Coordonnées géographiques

Un exercice classique avec six questions à choix multiples. Une question assez rare sur les coordonnées géographiques.

$$1. A = \frac{5}{3} - \frac{1}{3} \times \frac{3}{2} \text{ donc } A = \frac{5}{3} - \frac{1 \times 3}{3 \times 2}$$

$$A = \frac{5}{3} - \frac{1}{2} \text{ et } A = \frac{5 \times 2}{3 \times 2} - \frac{1 \times 3}{2 \times 3}$$

$$A = \frac{10}{6} - \frac{3}{6} \text{ d'où } A = \frac{7}{6} \text{ ainsi } \boxed{1. \text{ Réponse C}}.$$

$$2. 245 \times 10^{-5} = 2,45 \times 10^2 \times 10^{-5} \text{ donc } 245 \times 10^{-5} = 2,45 \times 10^{-3} \text{ ainsi } \boxed{2. \text{ Réponse B}}.$$

$$3. \frac{3+2+4+3+7+9+7}{7} = \frac{35}{7} = 5 \text{ donc } \boxed{3. \text{ Réponse C}}.$$

4. Il y a sept valeurs dans cette série statistiques. La médiane est donc la quatrième ($3 + 1 + 3 = 7$) quand on les classe dans l'ordre croissant.

Voici le classement : 2 ; 3 ; 3 ; 4 ; 7 ; 7 ; 9 et ainsi $\boxed{4. \text{ Réponse B}}$.

5. Nous sommes dans une situation d'**équiprobabilité** où chaque issue se réalise avec la même fréquence. Il y a 32 cartes et 4 rois.

$$\text{La probabilité cherchée est donc } \frac{4}{32} = \frac{1 \times 4}{8 \times 4} = \frac{1}{8} \text{ donc } \boxed{5. \text{ Réponse A}}.$$

6. La première coordonnée correspond à la **latitude** c'est à dire le décalage nord ou sud par rapport à l'équateur. La seconde coordonnée correspond à la **longitude** c'est à dire le décalage est ou ouest par rapport au méridien de Greenwich.

Au niveau de l'équateur, la latitude est donc égale à 0° . Ainsi $\boxed{6. \text{ Réponse C}}$.



EXERCICE n° 2 — La facture

8 points

Pourcentage — Tableur

Un exercice très simple qui utilise les pourcentages et le tableur.

$$1. \text{ Il faut calculer les } 22\% \text{ de } 18000. 18000 \times \frac{22}{100} = \frac{396000}{100} = 3960.$$

$\boxed{\text{Le montant TGC pour le pare choc est } 3960.}$

2. Le montant TGC de la main d'œuvre est 1 440 pour un prix HT de 24 000.

On peut utiliser un tableau de proportionnalité :

Montant HT	24 000	100
Montant TGC	1 440	$100 \times 1\,440 \div 24\,000 = 6$

Ou encore $\frac{1\,440}{24\,000} = 0,06$

Le pourcentage de TGC pour la main d'œuvre est de 6 %.

3. Dans la cellule E6 a été faite la somme des cellules E2, E3, E4 et E5.

On a saisi la formule : = E2 + E3 + E4 + E5 ou = SOMME(E2 : E5).



EXERCICE n° 3 — Programmes de calcul

11 points

Programme de calcul — Calcul littéral — Équation

Deux programmes de calcul intéressants. L'équation finale contient un terme en x^2 dans chaque membre, c'est une difficulté rare dans un sujet de brevet.

1. En partant du nombre 4 dans le Programme A on obtient successivement :
4 puis $4 - 5 = -1$ et $-1 \times 4 = -4$.

On obtient bien -4 en partant de 4 avec le Programme A.

2. En partant du nombre -3 dans le Programme B on obtient successivement :
 -3 puis $(-3)^2 = 9$ et enfin $9 - 4 = 5$.

On obtient 5 en partant de -3 avec le Programme B.

3. En partant d'un nombre générique x avec le Programme A on obtient successivement :
 x puis $x - 5$ et $(x - 5) \times x$.
Or $(x - 5) \text{ times } x = x^2 - 5x$.

Le Programme A peut donc s'écrire $x^2 - 5x$.

4. En partant d'un nombre générique x avec le Programme B on obtient successivement :
 x puis x^2 et enfin $x^2 - 4$.

Le Programme B peut donc s'écrire $x^2 - 4$.

5. Pour trouver le nombre que Tom cherche il faut résoudre l'équation :

$$\begin{aligned}x^2 - 5x &= x^2 - 4 \\x^2 - 5x - x^2 &= x^2 - 4 - x^2 \\-5x &= -4 \\x &= \frac{-4}{-5} \\x &= \frac{4}{5} \\x &= 0,8\end{aligned}$$

Vérifions :

Avec le Programme A on obtient :

$$0,8 - 5 = -4,2$$

$$-4,2 \times 0,8 = -3,36$$

$$0,8^2 = 0,64$$

$$0,64 - 4 = -3,36$$

Le nombre cherché par Tom est 0,8.



EXERCICE n° 4 — La régates

16 points

Théorème de Thalès — Réciproque du théorème de Pythagore — Vitesse

Un exercice qui mêle théorèmes de géométrie et vitesse. Pas de difficulté majeur, intéressant

1.

Les droites (AE) et (BD) sont sécantes en C, les droites (AB) et (DE) sont parallèles, D'après **le théorème de Thalès** on a :

$$\frac{CA}{CE} = \frac{CB}{CD} = \frac{AB}{ED}$$

$$\frac{300 \text{ m}}{CE} = \frac{500 \text{ m}}{700 \text{ m}} = \frac{400 \text{ m}}{ED}$$

En utilisant la règle de trois on obtient :

$$ED = \frac{400 \text{ m} \times 700 \text{ m}}{500 \text{ m}} \text{ d'où } ED = \frac{280\,000 \text{ m}^2}{500 \text{ m}} \text{ et } ED = 560 \text{ m.}$$

DE = 560 m.

2. Comparons $AB^2 + AC^2$ et BC^2 :

$AB^2 + AC^2$	BC^2
$400^2 + 300^2$	500^2
$160\,000 + 90\,000$	
250 000	250 000

Comme

$$AB^2 + AC^2 = BC^2$$

, d'après **la réciproque du théorème de Pythagore** le triangle ABC est rectangle en A.

3. Dans le triangle ABC rectangle en A on a :

On peut calculer le cosinus, le sinus ou la tangente de l'angle \widehat{ABC} .

$$\cos \widehat{ABC} = \frac{AB}{BC}$$

$$\cos \widehat{ABC} = \frac{4}{5}$$

$$\sin \widehat{ABC} = \frac{AC}{BC}$$

$$\cos \widehat{ABC} = \frac{400 \text{ m}}{500 \text{ m}}$$

$$\cos \widehat{ABC} = 0,8$$

$$\sin \widehat{ABC} = \frac{300 \text{ m}}{500 \text{ m}}$$

$$\sin \widehat{ABC} = \frac{3}{5}$$

$$\tan \widehat{ABC} = \frac{AC}{AB}$$

$$\tan \widehat{ABC} = \frac{3}{4}$$

$$\sin \widehat{ABC} = 0,6$$

$$\tan \widehat{ABC} = \frac{300 \text{ m}}{400 \text{ m}}$$

$$\tan \widehat{ABC} = 0,75$$

Dans tous les cas, à la calculatrice on trouve $\widehat{ABC} \approx 37^\circ$ à 1° près.

4. Cinq tours de 2880 m chacun. $2880 \text{ m} \times 5 = 14400 \text{ m}$.

La distance totale parcourue mesure 14400 m.

5. Mattéo a parcouru les 14400 m en 1 h 48 min.

Calculons la vitesse moyenne en considérant que la distance parcourue et le temps sont proportionnels.

Distance	14400 m	$\frac{60 \text{ min} \times 14400 \text{ m}}{108 \text{ min}} = 8000 \text{ m}$
Temps	1 h 48 min = 108 min	1 h = 60 min

Comme $8000 \text{ m} = 8 \text{ km}$, Mattéo a effectué le parcours à la vitesse moyenne de 8 km/h.



EXERCICE n° 5 — La corde

Théorème de Pythagore

7 points

Un exercice original où on teste la capacité à modéliser une situation. Dans le sujet original, le personnage dessiné n'était pas Morty Smith Sr!!

1. Dans le triangle ABC rectangle en B,
D'après le **théorème de Pythagore** on a :

$$BA^2 + BC^2 = AC^2$$

$$5^2 + BC^2 = 5,25^2$$

$$25 + BC^2 = 27,5625$$

$$BC^2 = 27,5625 - 25$$


$$BC^2 = 2,5625$$

$$BC = \sqrt{2,5625}$$

$$BC \approx 1,6$$

Au dixième de mètre près, $BC \approx 1,60 \text{ m}$.

2. Les poteaux sont distants de 10 m. Melvin se place au milieu, donc à 5 m des extrémités. Melvin se tient debout, donc son corps est perpendiculaire (vertical) au sol (horizontal). La corde non élastique mesure 10,5 m de long, sa moitié mesure donc $10,5 \text{ m} \div 2 = 5,25 \text{ m}$. La situation peut se modéliser de la manière suivante :



On constate qu'il s'agit de la situation géométrique de la question 1.. Nous avons vu que $BC \approx 1,60 \text{ m}$. Comme Melvin mesure $1,55 \text{ m}$, un peu moins que $1,60 \text{ m}$,

Il peut passer sous la corde sans se baisser.



EXERCICE n° 6 — Les étiquettes

14 points

Arithmétique

Un exercice d'arithmétique classique qui vise à déterminer un plus grand diviseur commun en utilisant la décomposition en produit de facteurs premiers.

1. On constate que $102 = 3 \times 34$. **102 est donc divisible par 3**.

On peut aussi utiliser le critère de divisibilité par 3 : $1 + 0 + 2 = 3$ et 3 est un multiple de 3.

2.

102	2
51	3
17	17
1	

Ainsi **$102 = 2 \times 3 \times 17$**

3. Il faut combiner les produits de nombres premiers de la décomposition de 102.

$2 \times 3 = 6$; $2 \times 17 = 34$ et $3 \times 17 = 51$ sont des diviseurs non premier de 102.

1 et 102 sont deux autres diviseurs non premiers de 102!

4. Il faut vérifier si 34 est un diviseur commun de 102 et 85.

Comme $102 = 34 \times 3$, 34 est un diviseur de 102.

Par contre $85 = 34 \times 2 + 17$ donc 34 ne divise pas 85.

Les étiquettes ne peuvent pas avoir un côté qui mesure 34 cm.

5. 17 est un diviseur commun de 102 et 85.

On a $102 = 17 \times 6$ et $85 = 17 \times 5$.

On peut donc découper 6 étiquettes sur la longueur et 5 étiquettes sur la largeur. Soit $6 \times 5 = 30$ étiquettes.

Il pourra découper 30 étiquettes.



EXERCICE n° 7 — L'habitation

15 points

Volume du cylindre — Volume du cône — Fonction linéaire — Lecture graphique

Un exercice un peu alambiqué qui mélange géométrie, volume et lecture graphique de fonctions.

Partie 1

1. Le volume du cylindre s'obtient en calculant : $\pi \times r^2 \times h$.

Ici comme $x = 6 \text{ m}$ on a $r = 3 \text{ m}$ et $h = OO' = 2 \text{ m}$.

Donc le volume mesure : $\pi \times (3 \text{ m})^2 \times 2 \text{ m} = \pi \times 9 \text{ m}^2 \times 2 \text{ m} = 18\pi \text{ m}^3$.

On a bien un volume de $18\pi \text{ m}^3$.

2. Le volume d'un cône s'obtient en calculant : $\frac{1}{3}\pi \times r^2 \times h$.

Ici comme $x = 6 \text{ m}$ on a $r = 3 \text{ m}$ et $h = SO' = 1 \text{ m}$.

Donc le volume mesure : $\frac{1}{3}\pi \times (3 \text{ m})^2 \times 1 \text{ m} = \frac{1}{3}\pi \times 9 \text{ m}^3 = \frac{9\pi}{3} \text{ m}^3 = 3\pi \text{ m}^3 \approx 9 \text{ m}^3$

Le volume du cône mesure environ 9 m^3 à l'unité près.

3. Le volume total de la case mesure donc : $18\pi \text{ m}^3 + 3\pi \text{ m}^3 = 21\pi \text{ m}^3 \approx 66 \text{ m}^3$.

Le volume total de la case mesure environ 66 m^3 à l'unité près.

Partie 2

1. Pour 7 m de diamètre le volume de la case mesure environ 90 m^3

2. $V(8) = 12,5 \times 8 = 100$

3. V est une fonction linéaire de coefficient $12,5$.

4. La représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite passant par l'origine du repère.

Comme $V(0) = 0$ et que $V(8) = 100$, la droite qui représente V passe par les points de coordonnées $(0;0)$ et $(8;100)$.

5. Pour $x < 6 \text{ m}$ la courbe de la fonction V est au dessus de l'autre courbe.

Il devra choisir la maison et non pas la case.




EXERCICE n° 8 — Scratch

11 points


Scratch

Un exercice Scratch avec peu de réponses demandées aux élèves. Pas difficile.

1.



2. Il s'agit de la figure suivante constituée de douze segments.



Informations légales

- Auteur : Fabrice ARNAUD
- Web : pi.ac3j.fr
- Mail : contact@ac3j.fr
- Nom fichier : Brevets.tex
- Dernière modification : 11 mai 2023

Le fichier source a été réalisé sous Linux Ubuntu avec l'éditeur Vim. Il utilise une balise spécifique à Vim pour permettre une organisation du fichier sous forme de replis. Cette balise `%{{{ ... %}}}` est un commentaire pour LaTeX, elle n'est pas nécessaire à sa compilation. Vous pouvez l'utiliser avec Vim en lui précisant que ce code définit un repli. Je vous laisse consulter la documentation officielle de Vim à ce sujet.

Versions de logiciels libres utilisés :

- pdfTeX 3.141592653-2.6-1.40.24 (TeX Live 2022/Debian)
- kpathsea version 6.3.4
- Compiled with libpng 1.6.39; using libpng 1.6.39
- Compiled with zlib 1.2.13; using zlib 1.2.13
- Compiled with xpdf version 4.04

Licence CC-BY-SA 4.0

Ce document est placé sous licence CC-BY-SA 4.0 qui impose certaines conditions de ré-utilisation.

Vous êtes autorisé :

- PARTAGER : copier, distribuer le matériel par tous moyens et sous tous formats;
- ADAPTER : remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale.

Selon les conditions suivantes :

- **ATTRIBUTION** : vous devez créditer le matériel, indiquer un lien vers la licence et indiquer si des modifications ont été effectuées. Vous devez indiquer ces informations par tous moyens raisonnables, sans toutefois suggérer que l'auteur vous soutient.
- **PARTAGE DANS LES MÊMES CONDITIONS** : Dans le cas où vous effectuez un remix, que vous transformez, ou créez à partir du matériel composant l'Oeuvre originale, vous devez diffuser l'Oeuvre modifiée dans les mêmes conditions, c'est-à-dire avec la même licence avec laquelle l'Oeuvre originale a été diffusée.
- **PAS DE RESTRICTIONS SUPPLÉMENTAIRES** : Vous n'êtes pas autorisé à appliquer des conditions légales ou des mesures techniques qui restreindraient légalement autrui à utiliser l'Oeuvre dans les conditions décrites par la licence.

Consulter : <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr>