



### Le théorème de Pythagore et sa réciproque

Pythagore vivait au VI<sup>e</sup> siècle av. J.-C., mais l'histoire du théorème de Pythagore commence plus d'un millénaire auparavant, comme en témoignent plusieurs tablettes d'argile de l'époque paléo-babylonienne. Il n'y a aucune preuve archéologique qui permette de remonter plus avant, même si quelques hypothèses existent.

Ainsi les travaux d'Alexander Thom, qui imagine une organisation de sites mégalithiques datant du XXV<sup>e</sup> siècle av. J.-C. en Grande-Bretagne et en France utilisant triangles rectangles et triplets pythagoriciens, sont fortement contestés. L'hypothèse parfois avancée que le théorème aurait été connu de l'Égypte ancienne dès le Moyen Empire paraît elle aussi difficile à établir. Les historiens des mathématiques et assyriologues ont découvert à la fin des années 1920 que s'était forgée en Mésopotamie (l'ancien Irak), à l'époque paléo-babylonienne une culture mathématique dont l'objet n'était pas purement utilitariste.

Plusieurs des tablettes d'argile qui ont été retrouvées et analysées montrent que la relation entre les longueurs des côtés du rectangle et celle de sa diagonale (soit entre les longueurs des côtés d'un triangle rectangle) était connue et utilisée pour résoudre des problèmes calculatoires. La tablette Plimpton 322 datant de vers -1800 donne une liste de nombres associés à des triplets pythagoriciens. La tablette ne donne que deux nombres du triplet, mais les associe explicitement au plus petit côté et à la diagonale d'un rectangle.

En Inde, un énoncé du théorème, sous sa forme la plus générale, apparaît dans l'Apastamba, l'un des Śulba-Sūtras, ces traités du cordeau qui codifient les règles des constructions destinées aux rituels védiques. Ceux-ci ont été rédigés entre le VIII<sup>e</sup> et le IV<sup>e</sup> siècle avant notre ère (par ailleurs certains triplets pythagoriciens sont mentionnés dans des textes bien antérieurs). Les Sulbasutras parlent du rectangle et de sa diagonale, plutôt que de triangle.

Le théorème apparaît également en Chine dans le Zhoubi suanjing (« Le Classique mathématique du Gnomon des Zhou »), un des plus anciens ouvrages mathématiques chinois. Ce dernier, écrit probablement durant la dynastie Han (206 av. J.-C. à 220), regroupe des techniques de calcul datant de la dynastie Zhou (Xe siècle av. J.-C. à -256).

Mais la question se pose de savoir si ce théorème — ou cette procédure — était muni ou non d'une démonstration. Sur ce point les avis sont partagés. Le théorème, sous le nom de Gougu (à partir des mots « base » et « altitude »), est repris dans le Jiuzhang suanshu (Les neuf chapitres sur l'art mathématique, 100 av. J.-C. à 50), avec une démonstration, utilisant un découpage et une reconstitution, qui ne ressemble pas à celle d'Euclide et qui illustre l'originalité du système démonstratif chinois.

Aucun texte connu de l'Égypte antique ne permet d'attribuer aux Égyptiens une connaissance en rapport avec le théorème de Pythagore, avant un document écrit sur papyrus en démotique, généralement daté vers 300 av. J.-C. qui mentionne trois triplets pythagoriciens. Ceci peut tenir à la fragilité du support employé : peu de textes mathématiques de l'Égypte antique nous sont parvenus. Mais le plus notable d'entre eux, le papyrus Rhind, une copie effectuée vers 1650 d'un document datant de 1800 av. J.-C., apparaît comme une somme des connaissances mathématiques de l'époque. Or ni triplets pythagoriciens, ni rien en rapport avec le théorème, n'y apparaît, ce qui laisse penser qu'il est ignoré à ces dates.

Il n'est cependant pas impossible que le triangle rectangle 3-4-5, celui dont les côtés correspondent au triplet pythagorien le plus simple, soit connu en Égypte dès une époque assez ancienne. Plutarque décrit (à la fin du I<sup>er</sup> siècle de notre ère) une

interprétation symbolique religieuse du triangle.

L'hypothèse de l'utilisation en architecture du triangle 3-4-5 obtenu en utilisant des cordes, éventuellement pourvues de nœuds espacés régulièrement, et tendues en particulier pour tracer des angles droits, est pour le moins discutée. Les faces de la pyramide de Khephren ont une pente de  $4/3$ , mais il existe des explications simples pour leur construction, qui ne supposent pas la connaissance du triangle correspondant. Il reste que la connaissance de ce que le triangle 3-4-5 est droit, même si elle n'a rien d'in vraisemblable, n'attesterait de toute façon nullement que les carrés des côtés aient été comparés, encore moins de la connaissance du théorème de Pythagore.

Le théorème et sa conclusion, accompagnés de démonstrations, concluent le livre I des *Éléments* d'Euclide, rédigés probablement au début du III<sup>e</sup> siècle av. J.-C.

Proclus dans ses commentaires (autour de l'an 400) relate, avec scepticisme, que certains attribuent à Pythagore la découverte du théorème, et attribue à Euclide la démonstration qu'il donne dans ses *Éléments*. Les témoignages connus au sujet des contributions mathématiques de Pythagore sont tardifs : au plus tôt du I<sup>er</sup> siècle av. J.-C., alors que Pythagore aurait vécu au VI<sup>e</sup> siècle avant notre ère. Il n'y a cependant aucun doute que le théorème était connu des Grecs bien avant Euclide, par exemple Hippocrate de Chio (V<sup>e</sup> siècle av. J.-C.), l'auteur du théorème des deux lunules, ne pouvait l'ignorer.

Plusieurs centaines de démonstrations différentes ont été répertoriées pour le théorème de Pythagore. La plupart sont construites sur des égalités d'aire obtenues par découpage et recollement, voire en utilisant des rapports d'aire de triangles semblables. La définition du produit scalaire en géométrie repérée fournit aussi une démonstration purement algébrique. De nombreuses autres démonstrations ont été recensées, utilisant des outils mathématiques variés. Léonard de Vinci et même le président américain James Garfield en ont proposé.<sup>[3]</sup>

**Plan du cours :**

**À rédiger !**


**Programme (BO n° 30 du 26-7-2018) :**

– **À rédiger !**

**Compétences :**

– **À rédiger !**

**SITUATION INITIALE : Aire et quadrillage**



Compléter le tableau suivant. L'unité de mesure des aires est le carreau.

Figure	Aire du petit carré	Aire du Carré moyen	Aire du grand carré
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Quelle conjecture pouvez-vous faire?

---

## I — Le théorème de Pythagore

---

### 🔗 DÉFINITION 2.1 : Vocabulaire du triangles rectangle

Un triangle ayant un angle droit est un **triangle rectangle**.

Les deux côtés perpendiculaires d'un triangle rectangle sont les **côtés de l'angle droit**. Le côté restant est l'**hypoténuse** du triangle rectangle. C'est le **côté opposé** à l'angle droit.

### 🔗 PROPRIÉTÉ 2.1 : Hypoténuse

Admise

Si un triangle est rectangle **alors** son plus grand côté est l'hypoténuse. <sup>1</sup>


---

### 🔗 DÉMONSTRATION :

Montrons que l'hypoténuse d'un triangle rectangle est le plus long côté.

Soit ABC un triangle rectangle en A et O le milieu de l'hypoténuse [BC].

On place D le symétrique du point A par rapport au point O.



Les diagonales du quadrilatère ABDC se coupent en leur milieu O donc ABCD est un parallélogramme.

De plus ABDC est un parallélogramme ayant un angle droit, il s'agit donc d'un rectangle.

On sait que dans un rectangle les diagonales ont la même longueur, elles ont le même milieu O.

Ainsi  $OA = OB = OC = OD$

Dans le triangle OBA l'inégalité triangulaire affirme que  $AB \leq AO + OB$  or  $AO = OC$  d'où  $AB \leq OB + OC$ . Comme  $OB + OC = BC$  on a  $AB \leq BC$

De même dans le triangle OCA on prouve que  $AC \leq BC$ .

Le segment [BC] est bien le plus grand côté du triangle ABC rectangle en A


CQFD

---

## THÉORÈME 2.1 : Le théorème de Pythagore

Admis

Si un triangle est rectangle **alors** la somme des carrés des mesures des côtés de l'angle droit est égale au carré de la mesure de l'hypoténuse.




Si ABC est un triangle rectangle en A **alors**  $AB^2 + AC^2 = BC^2$  ( **Égalité de Pythagore** )

### DÉMONSTRATION :

Les carrés dans l'égalité de Pythagore correspondent aux aires des carrés construits sur les côtés du triangle rectangle. Les démonstrations proposées ici visent donc à montrer que la somme des aires des deux petits carrés est égale à l'aire du plus grand.

Voici la démonstration que l'on trouve dans les **Éléments d'Euclide**.



Dans le triangle ABD, l'angle  $\widehat{DBA} = 90^\circ + \widehat{CBA}$ .

Dans le triangle BCF, l'angle  $\widehat{CBF} = 90^\circ + \widehat{CBA}$ .

Ainsi  $\widehat{DBA} = \widehat{CBF}$ . De plus  $FB = AB$  et  $BC = BD$ .

Les triangles CBF et ABD ont deux angles égaux dont les côtés ont la même longueur. Les triangles ABD et CBF sont donc superposables.

On arrive enfin à  $Aire(ABD) = Aire(CBF)$ .

Par le même raisonnement au fait que les triangles BCI et ACE sont aussi superposables.

De même  $Aire(BCI) = Aire(ACE)$

Le triangle FBC a pour base le segment [FB] et sa hauteur mesure la longueur AB puisque ABFG est un carré.

Ainsi l'aire du triangle FBC vaut  $FB \times AB \div 2$  soit la moitié de l'aire du carré ABFG.

Par le même raisonnement on prouve que l'aire du triangle BCI vaut la moitié de l'aire du carré ACIH

Le triangle ABD a pour base le segment [BD] et sa hauteur mesure la longueur BJ puisque BDKJ est un rectangle.

Ainsi l'aire du triangle ABD vaut la moitié de celle du rectangle BDKJ.


De même l'aire du triangle ACE vaut la moitié de celle du rectangle CEKJ.

Finalement l'aire du carré ABFG vaut le double de celle du triangle FBC donc le double de celle du triangle ABD soit l'aire du rectangle BDKJ.

De même l'aire du carré ACIH est égale à celle du rectangle CEKJ.

On arrive enfin au fait que la somme des aires des petits carrés est égale à l'aire du plus grand.


### Démonstration par soustraction d'aires égales



On constate l'égalité suivante entre les aires :

$$A + B = C$$

Pour justifier la construction il peut être utile de faire la remarque suivante :



Les triangles rectangles ABC et BDE sont superposables. Les angles  $\widehat{ABC}$  et  $\widehat{BED}$  sont donc égaux, il en est de même des angles  $\widehat{ACB}$  et  $\widehat{EBD}$ .

On sait que dans un triangle rectangles, les angles aigus sont complémentaires, c'est-à-dire que  $\widehat{ABC} + \widehat{ACB} = 90^\circ$ .

On en déduit que  $\widehat{ABC} + \widehat{DBE} = 90^\circ$ . Comme  $\widehat{ABD}$  est plat, on arrive au fait que  $\widehat{CBE}$  est droit.

Cela justifie le fait que l'existence du carré de la seconde figure!

### Démonstration de Périgal en 1917

Voir en annexe!

CQFD

---

#### REMARQUE :

$7^2 = \underbrace{7 \times 7}_{2 \text{ fois}} = 49$ . À ne pas confondre avec  $7 \times 2 = \underbrace{7 + 7}_{2 \text{ fois}} = 14$


---

## II — Application du théorème de Pythagore et racine carrée

---

#### CALCUL DE L'HYPOTÉNUSE CONNAISSANT LES DEUX CÔTÉS DE L'ANGLE DROIT :

On étudie le triangle GHT rectangle en H tel que  $HG = 4 \text{ cm}$  et  $HT = 3 \text{ cm}$ . On trace ce triangle et on constate en mesurant que  $GT \approx 5 \text{ cm}$



Dans le triangle GHT rectangle en H, d'après **le théorème de Pythagore** on a :

$$HG^2 + HT^2 = GT^2$$

$$4^2 + 3^2 = GT^2$$

$$GT^2 = 16 + 9$$


$$GT^2 = 25$$

GT est donc un nombre dont le carré est 25,  $GT = 5$  car  $5^2 = 25$

L'hypoténuse [GT] mesure  $5 \text{ cm}$ .

#### CALCUL D'UN CÔTÉ DE L'ANGLE DROIT CONNAISSANT L'HYPOTÉNUSE ET UN AUTRE CÔTÉ :

On étudie le triangle QMK rectangle en Q tel que  $QM = 12 \text{ cm}$  et  $MK = 13 \text{ cm}$ . On mesure et on constate que  $QK \approx 5 \text{ cm}$ .





Dans le triangle QMK rectangle en Q, d'après **le théorème de Pythagore** on a :

$$QM^2 + QK^2 = MK^2$$

$$12^2 + QK^2 = 13^2$$

$$144 + QK^2 = 169$$


$$QK^2 = 169 - 144$$

$$QK^2 = 25$$

QK est donc un nombre dont le carré est 25,  $QK = 5$

**CALCUL D'UN CÔTÉ DONT LA MESURE AU CARRÉ NE SOIT PAS UN CARRÉ PARFAIT :**

On étudie le triangle RAK rectangle en K tel que  $KR = 4,95 \text{ cm}$  et  $KA = 6,6 \text{ cm}$ . Calculons la mesure du côté [AR].



Dans le triangle RAK rectangle en K, d'après **le théorème de Pythagore** on a :

$$KA^2 + KR^2 = AR^2$$

$$6,6^2 + 4,95^2 = AR^2$$

$$AR^2 = 43,56 + 24,5025$$

$$AR^2 = 68,0625$$

On ne connaît pas immédiatement un nombre dont le carré vaut exactement 68,0625.

Notons  $x$  ce nombre.

Comme  $8^2 = 64 < 68,0625 < 81 = 9^2$  on en déduit que  $8 < x < 9$ .

En utilisant la calculatrice on trouve que  $8,2^2 = 67,24 < 68,0625 < 68,89 = 8,3^2$  et donc que  $8,2 < x < 8,3$ .

On constate alors que  $8,25^2 = 68,0625$ .

Finalement  $AR = 8,25 \text{ cm}$ .

### **PROPRIÉTÉ 2.2 : La racine carrée**

Admise

Pour tout nombre positif  $a$ , il existe un unique nombre positif dont le carré vaut exactement le nombre  $a$ .

Ce nombre s'appelle la **racine carrée** de  $a$  et se note  $\sqrt{a}$ .

Par définition  $(\sqrt{a})^2 = \sqrt{a} \times \sqrt{a} = a$

**EXEMPLES :**

$$\sqrt{0} = 0 \text{ et } \sqrt{1} = 1.$$

$$\sqrt{49} = 7 \text{ car } 7^2 = 49.$$

La plupart des racines carrées ne sont pas des nombres décimaux, ni même des nombres rationnels.

$$\sqrt{2} \approx 1,41421 \text{ et } \sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$$

---

### MÉTHODE 2.1 : Calculer la mesure du côté d'un triangle rectangle

Pour utiliser le théorème de Pythagore il faut connaître la mesure de deux côtés et vouloir calculer la mesure du troisième.

- Nommer le triangle rectangle et bien repérer l'angle droit;
  - invoquer le théorème de Pythagore et écrire l'égalité en veillant à l'angle droit;
  - si on cherche la mesure de l'hypoténuse, on effectue la somme des carrés des deux autres côtés;
  - si on cherche la mesure d'un autre côté, on fait la différence du carré de l'hypoténuse et de l'autre côté;
  - une fois le carré obtenu il suffit de calculer la racine carrée pour obtenir la mesure.
- 

---

## III — La réciproque du théorème de Pythagore

---

### 🌀 THÉORÈME 2.2 : Contraposée du théorème de Pythagore

(Admis)

Si dans un triangle l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée **alors** ce triangle n'est pas rectangle.

---

### 🌀 DÉMONSTRATION :

C'est une conséquence de la logique des propositions.

Prenons un exemple simple :

**Propriété :** Si nous sommes le 25 décembre alors je ne vais pas à l'école.

La propriété contraposée est : Si je vais à l'école alors nous ne sommes pas le 25 décembre.

On comprend que quand une propriété est vraie alors la propriété contraposée est également vraie.

Dans le cas du théorème de Pythagore, si l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée alors le triangle n'est pas rectangle car s'il était rectangle l'égalité serait vérifiée!


CQFD

---

### EXEMPLE :

Un triangle TYP est tel que  $TY = 33 \text{ mm}$ ,  $TP = 56 \text{ mm}$  et  $YP = 66 \text{ mm}$

En dessinant ce triangle, il semble rectangle.



Vérifions : comparons  $TY^2 + TP^2$  et  $YP^2$

$$TY^2 + TP^2 = 33^2 + 56^2$$

$$TY^2 + TP^2 = 1089 + 3136$$

$$TY^2 + TP^2 = 4225$$

$$YP^2 = 66^2$$

$$YP^2 = 4356$$

Ainsi  $TY^2 + TP^2 \neq YP^2$

D'après le **théorème contraposé de Pythagore**, le triangle TYP n'est pas rectangle.

### 🌀 THÉORÈME 2.3 : Réciproque du théorème de Pythagore


(Admis)

Si dans un triangle l'égalité de Pythagore est vérifiée **alors** ce triangle est rectangle.

#### 🌀 DÉMONSTRATION :

Ce théorème, contrairement au théorème contraposé, demande une démonstration.

Soit ABC un triangle a priori quelconque vérifiant l'égalité de Pythagore, par exemple  $AB^2 + AC^2 = BC^2$  ce qui suppose que BC est le plus long côté.



Plaçons de l'autre côté du segment [BC] un point D tel que BCD soit rectangle en D et  $BD = AC$ . (Cela revient à tracer un triangle rectangle connaissant la mesure de l'hypoténuse et un côté de l'angle droit).

Comme BCD est rectangle en D, d'après le théorème de Pythagore on a :

$$DB^2 + DC^2 = BC^2$$

Or  $BD = AC$  et  $AB^2 + AC^2 = BC^2$  d'où  $AC^2 + DC^2 = AB^2 + AC^2$  c'est-à-dire  $DC^2 = AB^2$  donc  $DC = AB$  (ce sont des longueurs!).

Le quadrilatère ABDC a donc ses côtés opposés AB et DC de même longueur, ainsi que les côtés opposés BD et AC

On sait que **Si un quadrilatère non croisé a ses côtés opposés de même longueur deux à deux alors c'est un parallélogramme.**

On en déduit que ABDC est un parallélogramme.

De plus ce parallélogramme a un angle droit en D.


On sait que **Si un parallélogramme a un angle droit alors c'est un rectangle.**

Finalement ABDC est un rectangle, ce qui prouve que ABC est un triangle rectangle en A.

CQFD

#### EXEMPLE :

POI un triangle tel que :  $PO = 97 \text{ mm}$ ,  $PI = 72 \text{ mm}$  et  $OI = 65 \text{ mm}$ .



Ce triangle est-il rectangle ?

Comme PO est le plus long côté, comparons  $PO^2$  et  $IP^2 + IO^2$

$$PO^2 = 97^2$$

$$PO^2 = 9409$$

$$IP^2 + IO^2 = 72^2 + 65^2$$

$$IP^2 + IO^2 = 5184 + 4225$$

$$IP^2 + IO^2 = 9409$$

Ainsi  $IP^2 + IO^2 = PO^2$ , d'après **la réciproque du théorème de Pythagore**, le triangle POI est rectangle en P.

---

### MÉTHODE 2.2 : Déterminer si un triangle est rectangle

Étant données les trois mesures des côtés d'un triangle :

- Déterminer le plus grand côté (il est candidat pour être l'hypoténuse) ;
  - calculer le carré de la mesure du plus grand côté ;
  - calculer la somme des carrés des mesures des deux plus petits côtés ;
  - vérifier si les deux calculs précédents sont égaux ou non :
    - si les deux calculs sont exactement égaux, l' **égalité de Pythagore** est vérifiée, la réciproque du théorème de Pythagore affirme que le triangle est rectangle ;
    - si les deux calculs ne sont pas égaux, l' **égalité de Pythagore** n'est pas vérifiée, la contraposée du théorème de Pythagore affirme que le triangle n'est pas rectangle.
-

**QUESTION DU JOUR N° 1 :** Mesurer et calculer le côté d'un triangle rectangle

Tracer le triangle RIZ rectangle en Z tel que  $ZR = 6 \text{ cm}$  et  $ZI = 8 \text{ cm}$ .  
Mesurer la longueur du segment RI puis calculer la longueur exacte de RI.

**QUESTION DU JOUR N° 2 :** Mesurer et calculer le côté d'un triangle rectangle – Épisode 2

Tracer le triangle GLU rectangle en U tel que  $UR = 4,5 \text{ cm}$  et  $GL = 7,5 \text{ cm}$ .  
Mesurer la longueur du segment UL puis calculer la longueur exacte de UL.

**QUESTION DU JOUR N° 3 :** Mesurer et calculer le côté d'un triangle rectangle – Épisode 3


Tracer le triangle AHU rectangle en A tel que  $AH = 28 \text{ mm}$  et  $AU = 45 \text{ mm}$ .  
Mesurer la longueur du segment HU puis calculer la longueur exacte de HU.

**QUESTION DU JOUR N° 4 :** Mesurer et calculer le côté d'un triangle rectangle – Épisode 4

Tracer le triangle KAT rectangle en T tel que  $TK = 3,3 \text{ cm}$  et  $KA = 6,5 \text{ cm}$ .  
Mesurer la longueur du segment AT puis calculer la longueur exacte de AT.

**QUESTION DU JOUR N° 5 :** Deux à la suite

En tenant compte des codages et des longueurs indiquées, calculer la valeur exacte puis la valeur approchée au millimètre près de la longueur BD.



**QUESTION DU JOUR N° 6 :** Rectangle ou pas ?

Tracer le triangle ZOE tel que  $ZO = 48 \text{ mm}$ ,  $ZE = 55 \text{ mm}$  et  $OE = 73 \text{ mm}$ . ZOE est-il rectangle ?


**QUESTION DU JOUR N° 7 :** Rectangle ou pas ? – Épisode 2

Tracer le triangle KAE tel que  $KE = 36 \text{ mm}$ ,  $KA = 77 \text{ mm}$  et  $AE = 84 \text{ mm}$ . KAE est-il rectangle ?

**QUESTION DU JOUR N° 8 :** Rectangle ou pas ? – Épisode 3

Le carré ABCD a des côtés de  $4 \text{ cm}$ .  
 $E \in [CD]$  tel que  $CE = 3 \text{ cm}$   
 $F \in [BC]$  tel que  $BF = 3 \text{ cm}$

Le triangle AEF est-il rectangle ?



**EXERCICE N° 2.1 : Théorème de Pythagore en mesurant**

Tracer le triangle JHG rectangle en J tel que  $JH = 2,8 \text{ cm}$  et  $JG = 4,5 \text{ cm}$   
Mesurer puis calculer la longueur HG.

**EXERCICE N° 2.2 : Théorème de Pythagore en mesurant – Épisode 2**

Tracer le triangle POL rectangle en P tel que  $OL = 65 \text{ mm}$  et  $PO = 33 \text{ mm}$   
Mesurer puis calculer la longueur LP.

**EXERCICE N° 2.3 : Théorème de Pythagore sans mesurer**

Le triangle PHA rectangle en H est tel que  $HA = 48 \text{ km}$  et  $HP = 55 \text{ km}$ .  
Tracer un croquis puis calculer la longueur PA.

**EXERCICE N° 2.4 : Théorème de Pythagore sans mesurer**


Le triangle FAB rectangle en B est tel que  $FB = 65 \text{ m}$  et  $AB = 97 \text{ m}$ .  
Tracer un croquis puis calculer la longueur FA.

**EXERCICE N° 2.5 : Théorème de Pythagore valeur approchée**


Un rectangle mesure  $5 \text{ cm}$  de long et  $4 \text{ cm}$  de large.  
Calculer la valeur exacte de sa diagonale puis une valeur approchée au millimètre près.

**EXERCICE N° 2.6 : Théorème de Pythagore valeur approchée – Épisode 2**

Le triangle AEI rectangle en I est tel que  $AE = 7 \text{ m}$  et  $EI = 3 \text{ m}$ .  
Calculer la valeur exacte de AI puis une valeur approchée au centimètre près.

**EXERCICE N° 2.7 : Théorème de Pythagore : deux à la suite**

Sur la figure ci-après,  
 $AB = 5 \text{ cm}$ ,  $BC = 3 \text{ cm}$  et  $AD = 4 \text{ cm}$ .  
Calculer la valeur exacte de DC puis donner une valeur approchée au millimètre près.

**EXERCICE N° 2.8 : Théorème de Pythagore : deux à la suite – Épisode 2**

Sur la figure ci-après,  
 $AB = 4 \text{ cm}$ ,  $AC = 3 \text{ cm}$  et  $CD = 2 \text{ cm}$ .

Calculer la valeur exacte de DB puis donner une valeur approchée au millimètre près.

NOM :

PRÉNOM :

CLASSE :

1. Tracer le triangle UYR rectangle en Y tel que  $UY = 28 \text{ mm}$  et  $RY = 45 \text{ mm}$ . Calculer UR.

---

2. Tracer le triangle MLO rectangle en O tel que  $ML = 8,9 \text{ cm}$  et  $OL = 3,9 \text{ cm}$ . Calculer MO.

NOM :

PRÉNOM :

CLASSE :

1. Tracer le triangle ZER rectangle en Z tel que  $ZE = 33 \text{ mm}$  et  $ZR = 56 \text{ mm}$ . Calculer ER.

---

2. Tracer le triangle PUT rectangle en P tel que  $UT = 9,7 \text{ cm}$  et  $PU = 7,2 \text{ cm}$ . Calculer PT.



NOM :

PRÉNOM :

CLASSE :

1. Tracer le triangle ATH rectangle en A tel que  $AT = 36 \text{ mm}$  et  $AH = 77 \text{ mm}$ . Calculer TH.

---


2. Tracer le triangle KWX rectangle en W tel que  $KX = 8,9 \text{ cm}$  et  $WX = 8 \text{ cm}$ . Calculer KW.

NOM :

PRÉNOM :

CLASSE :

1. Tracer le triangle UYR rectangle en Y tel que  $UY = 28 \text{ mm}$  et  $RY = 45 \text{ mm}$ . Calculer UR.



Dans le triangle YUR rectangle en Y,  
D'après **le théorème de Pythagore** on a :

$$YU^2 + YR^2 = UR^2$$

$$28^2 + 45^2 = UR^2$$

$$784 + 2025 = UR^2$$


$$UR^2 = 2809$$

$$UR = \sqrt{2809}$$

$$UR = 53$$

$$\boxed{UR = 53 \text{ mm}}$$

2. Tracer le triangle MLO rectangle en O tel que  $ML = 8,9 \text{ cm}$  et  $OL = 3,9 \text{ cm}$ . Calculer MO.



Dans le triangle MLO rectangle en O,  
D'après **le théorème de Pythagore** on a :

$$OM^2 + OL^2 = ML^2$$

$$OM^2 + 3,9^2 = 8,9^2$$

$$OM^2 + 15,21 = 79,21$$

$$OM^2 = 79,21 - 15,21$$

$$OM^2 = 64$$

$$OM = \sqrt{64}$$

$$OM = 8$$


$$\boxed{OM = 8 \text{ cm}}$$

NOM :

PRÉNOM :

CLASSE :

1. Tracer le triangle ZER rectangle en Z tel que  $ZE = 33 \text{ mm}$  et  $ZR = 56 \text{ mm}$ . Calculer ER.



Dans le triangle ZER rectangle en Z,  
D'après **le théorème de Pythagore** on a :

$$ZR^2 + ZE^2 = ER^2$$

$$56^2 + 33^2 = ER^2$$

$$3136 + 1089 = ER^2$$


$$ER^2 = 4225$$

$$ER = \sqrt{4225}$$

$$ER = 65$$

$$\boxed{ER = 65 \text{ mm}}$$

2. Tracer le triangle PUT rectangle en P tel que  $UT = 9,7 \text{ cm}$  et  $PU = 7,2 \text{ cm}$ . Calculer PT.



Dans le triangle PUT rectangle en P,  
D'après **le théorème de Pythagore** on a :

$$PU^2 + PT^2 = UT^2$$

$$7,2^2 + PT^2 = 9,7^2$$

$$51,84 + PT^2 = 94,09$$

$$PT^2 = 94,09 - 51,85$$

$$PT^2 = 42,25$$

$$PT = \sqrt{42,25}$$

$$PT = 6,5$$


$$\boxed{PT = 6,5 \text{ cm}}$$

NOM :

PRÉNOM :

CLASSE :

1. Tracer le triangle ATH rectangle en A tel que  $AT = 36 \text{ mm}$  et  $AH = 77 \text{ mm}$ . Calculer TH.



Dans le triangle ATH rectangle en A,  
D'après **le théorème de Pythagore** on a :

$$AH^2 + AT^2 = TH^2$$

$$77^2 + 36^2 = TH^2$$

$$5929 + 1296 = TH^2$$


$$TH^2 = 7225$$

$$TH = \sqrt{7225}$$

$$TH = 85$$

$$\boxed{TH = 85 \text{ mm}}$$

2. Tracer le triangle KWX rectangle en W tel que  $KX = 8,9 \text{ cm}$  et  $WX = 8 \text{ cm}$ . Calculer KW.



Dans le triangle KWX rectangle en W,  
D'après **le théorème de Pythagore** on a :

$$WK^2 + WX^2 = KX^2$$

$$WK^2 + 8^2 = 8,9^2$$

$$WK^2 + 64 = 79,21$$

$$WK^2 = 79,21 - 64$$

$$WK^2 = 15,21$$


$$WK = \sqrt{15,21}$$

$$WK = 3,9$$

$$\boxed{WK = 3,9 \text{ cm}}$$

# Contrôle de mathématiques

## EXERCICE 1



Cette figure n'est pas réalisée en vraies grandeurs!

1. Démontrer en détaillant votre raisonnement que  $HE = 65 \text{ cm}$ .
2. Démontrer en détaillant votre raisonnement que  $MH = 16 \text{ cm}$ .


## EXERCICE 2

1. Le triangle ABC est-il rectangle?

Justifier votre réponse par un raisonnement détaillé.


2. Le triangle ABD est-il rectangle?

Justifier votre réponse par un raisonnement détaillé.



Cette figure n'est pas réalisée en vraies grandeurs!

## EXERCICE 3



Cette figure n'est pas réalisée en vraies grandeurs!

KLMN est un carré de côté  $5 \text{ cm}$

$P \in [KN]$  tel que  $KP = 3 \text{ cm}$

$Q \in [NM]$  tel que  $QM = 2 \text{ cm}$

1. Calculer en justifiant votre raisonnement les longueurs QP, PL et LQ
2. Le triangle PLQ est-il rectangle?  
Justifier votre réponse par un raisonnement détaillé.

## EXERCICE 4

Voici deux expressions littérales :  $M = (x - y) - (y - x)$  et  $N = x - (y - x) - y$

1. Calculer M et N pour  $x = -1$  et  $y = 3$  en détaillant vos calculs.
2. Calculer M et N pour  $x = 5$  et  $y = -5$  en détaillant vos calculs.
3. Quelle conjecture pouvez-vous faire?

# Correction

## Exercice 1

1. Dans le triangle HDE rectangle en D, d'après **le théorème de Pythagore** on a :

$$DH^2 + DE^2 = EH^2$$

$$56^2 + 33^2 = EH^2$$

$$EH^2 = 3136 + 1089$$

$$EH^2 = 4225$$

$$EH = \sqrt{4225}$$

$$EH = 65$$

Donc  $EH = 65 \text{ cm}$ .

2. Dans le triangle HME rectangle en M, d'après **le théorème de Pythagore** on a :

$$MH^2 + ME^2 = EH^2$$

$$MH^2 + 63^2 = 65^2$$

$$MH^2 + 3969 = 4225$$

$$MH^2 = 4225 - 3969$$

$$MH^2 = 256$$

$$MH = \sqrt{256}$$

$$MH = 16$$

Donc  $MH = 16 \text{ cm}$ .

## Exercice 2

1. Comparons  $CA^2 + CB^2$  et  $AB^2$

$$CA^2 + CB^2 = 77^2 + 36^2$$

$$CA^2 + CB^2 = 5929 + 1296$$

$$CA^2 + CB^2 = 7225$$

$$AB^2 = 85^2$$

$$AB^2 = 7225$$

Comme  $CA^2 + CB^2 = AB^2$  d'après **la réciproque du théorème de Pythagore** le triangle ABC est rectangle C.

2. Comparons  $DA^2 + DB^2$  et  $AB^2$

$$DA^2 + DB^2 = 75^2 + 40^2$$

$$DA^2 + DB^2 = 5625 + 1600$$

$$DA^2 + DB^2 = 7225$$

$$AB^2 = 85^2$$

$$AB^2 = 7225$$

Comme  $DA^2 + DB^2 = AB^2$  d'après **la réciproque du théorème de Pythagore** le triangle ADC est rectangle D.

## Exercice 3

1. Comme KLMN est un carré, les triangles NPQ, QML et PKL sont rectangles respectivement en N, M et K.

Dans le triangle NPQ rectangle en N, d'après **le théorème de Pythagore** :

$$NQ^2 + NP^2 = QP^2$$

$$3^2 + 2^2 = QP^2$$

$$QP^2 = 9 + 4$$

$$QP^2 = 13$$

$$QP = \sqrt{13}$$

Dans le triangle QLM rectangle en M, d'après **le théorème de Pythagore** :

$$MQ^2 + ML^2 = QL^2$$

$$2^2 + 5^2 = QL^2$$

$$QL^2 = 4 + 25$$

$$QL^2 = 29$$

$$QL = \sqrt{29}$$

Dans le triangle PKL rectangle en K, d'après **le théorème de Pythagore** :

$$KL^2 + KP^2 = PL^2$$

$$5^2 + 3^2 = PL^2$$

$$PL^2 = 25 + 9$$

$$PL^2 = 34$$

$$PL = \sqrt{34}$$

2. Comparons  $QP^2 + QL^2$  et  $PL^2$

$$QP^2 + QL^2 = (\sqrt{13})^2 + (\sqrt{29})^2$$

$$QP^2 + QL^2 = 13 + 29$$

$$QP^2 + QL^2 = 42$$

$$PL^2 = (\sqrt{34})^2$$

$$PL^2 = 34$$

Comme  $QP^2 + QL^2 \neq PL^2$  d'après **la contraposée du théorème de Pythagore**, le triangle PQL n'est pas rectangle.

## Exercice 4

1. Pour  $x = -1$  et  $y = 3$

$$M = (-1 - 3) - (3 - (-1))$$

$$M = -4 - (3 + 1)$$

$$M = -4 - 4$$

$$M = -8$$

$$N = -1 - (3 - (-1)) - 3$$

$$N = -1 - (3 + 1) - 3$$

$$N = -1 - 4 - 3$$

$$N = -8$$

2. Pour  $x = 5$  et  $y = -5$

$$M = (5 - (-5)) - (-5 - 5)$$

$$M = (5 + 5) - (-10)$$

$$M = 10 + 10$$

$$M = 20$$

$$N = 5 - (-5 - 5) - (-5)$$

$$N = 5 - (-10) + 5$$

$$N = 5 + 10 + 5$$


$$N = 20$$

3. Conjecture : les expressions M et N sont équivalentes!


# Contrôle de mathématiques

**EXERCICE 1** | Les deux figures ci-dessous ne sont pas en vraie grandeur.

(5 points)




Donner une valeur approchée au dixième près de AC.



Donner une valeur approchée au centième près de UV.

**EXERCICE 2**

(5 points)



Cette figure n'est pas réalisée en vraies grandeurs!


- Démontrer en détaillant votre raisonnement que  $HE = 65 \text{ cm}$ .
- Démontrer en détaillant votre raisonnement que  $MH = 16 \text{ cm}$ .

**EXERCICE 3**

(5 points)


- Le triangle ABC est-il rectangle? Justifier votre réponse par un raisonnement détaillé.
- Le triangle ABD est-il rectangle? Justifier votre réponse par un raisonnement détaillé.

Cette figure n'est pas réalisée en vraies grandeurs!



**EXERCICE 4**

(5 points)



Cette figure n'est pas réalisée en vraies grandeurs!

KLMN est un carré de côté  $5 \text{ cm}$

$P \in [KN]$  tel que  $KP = 3 \text{ cm}$

$Q \in [NM]$  tel que  $QM = 2 \text{ cm}$

- Calculer en justifiant votre raisonnement les longueurs QP, PL et LQ
- Le triangle PLQ est-il rectangle? Justifier votre réponse par un raisonnement détaillé.

# Correction

## Exercice 1

### Calcul de AC dans le triangle ABC

Dans le triangle ABC rectangle en B,  
D'après **le théorème de Pythagore** on a :

$$BA^2 + BC^2 = AC^2$$

$$5^2 + 3^2 = AC^2$$

$$25 + 9 = AC^2$$

$$AC^2 = 34$$

$$AC = \sqrt{34}$$

$$BC \approx 5,8$$

$$AC \approx 5,8 \text{ cm}$$

### Calcul de VU dans le triangle VUR

Dans le triangle RUV rectangle en U,  
D'après **le théorème de Pythagore** on a :

$$UR^2 + UV^2 = RV^2$$

$$12^2 + UV^2 = 15^2$$

$$144 + UV^2 = 225$$

$$UV^2 = 225 - 144$$

$$UV^2 = 81$$

$$UV = \sqrt{81}$$

$$UV = 9$$

$$UV = 9 \text{ m}$$

## Exercice 2

1. Dans le triangle HDE rectangle en D, d'après **le théorème de Pythagore** on a :

$$DH^2 + DE^2 = EH^2$$

$$56^2 + 33^2 = EH^2$$

$$EH^2 = 3136 + 1089$$

$$EH^2 = 4225$$

$$EH = \sqrt{4225}$$

$$EH = 65$$

Donc  $EH = 65 \text{ cm}$ .

2. Dans le triangle HME rectangle en M, d'après **le théorème de Pythagore** on a :

$$MH^2 + ME^2 = EH^2$$

$$MH^2 + 63^2 = 65^2$$

$$MH^2 + 3969 = 4225$$

$$MH^2 = 4225 - 3969$$

$$MH^2 = 256$$

$$MH = \sqrt{256}$$

$$MH = 16$$

Donc  $MH = 16 \text{ cm}$ .



### Exercice 3

#### 1. Comparons $CA^2 + CB^2$ et $AB^2$

$$\begin{aligned}CA^2 + CB^2 &= 77^2 + 36^2 \\CA^2 + CB^2 &= 5929 + 1296 \\CA^2 + CB^2 &= 7225\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}AB^2 &= 85^2 \\AB^2 &= 7225\end{aligned}$$

Comme  $CA^2 + CB^2 = AB^2$  d'après **la réciproque du théorème de Pythagore** le triangle ABC est rectangle C.

#### 2. Comparons $DA^2 + DB^2$ et $AB^2$

$$\begin{aligned}DA^2 + DB^2 &= 75^2 + 40^2 \\DA^2 + DB^2 &= 5625 + 1600 \\DA^2 + DB^2 &= 7225\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}AB^2 &= 85^2 \\AB^2 &= 7225\end{aligned}$$

Comme  $DA^2 + DB^2 = AB^2$  d'après **la réciproque du théorème de Pythagore** le triangle ADC est rectangle D.

### Exercice 4

#### 1. Comme KLMN est un carré, les triangles NPQ, QML et PKL sont rectangles respectivement en N, M et K.

Dans le triangle NPQ rectangle en N, d'après **le théorème de Pythagore** :

$$\begin{aligned}NQ^2 + NP^2 &= QP^2 \\3^2 + 2^2 &= QP^2 \\QP^2 &= 9 + 4 \\QP^2 &= 13 \\QP &= \sqrt{13}\end{aligned}$$

Dans le triangle QLM rectangle en M, d'après **le théorème de Pythagore** :

$$\begin{aligned}MQ^2 + ML^2 &= QL^2 \\2^2 + 5^2 &= QL^2 \\QL^2 &= 4 + 25 \\QL^2 &= 29 \\QL &= \sqrt{29}\end{aligned}$$

Dans le triangle PKL rectangle en K, d'après **le théorème de Pythagore** :

$$\begin{aligned}KL^2 + KP^2 &= PL^2 \\5^2 + 3^2 &= PL^2 \\PL^2 &= 25 + 9 \\PL^2 &= 34 \\PL &= \sqrt{34}\end{aligned}$$

#### 2. Comparons $QP^2 + QL^2$ et $PL^2$

$$QP^2 + QL^2 = (\sqrt{13})^2 + (\sqrt{29})^2$$

$$QP^2 + QL^2 = 13 + 29$$

$$QP^2 + QL^2 = 42$$

$$PL^2 = (\sqrt{34})^2$$

$$PL^2 = 34$$

Comme  $QP^2 + QL^2 \neq PL^2$  d'après **la contraposée du théorème de Pythagore**, le triangle PQL n'est pas rectangle.

# Évaluation



## Exercice n° 1 :

(6 points)



Calculer les expressions suivantes en détaillant les étapes.

$$A = (7 - 9 - 13) - (1 - 6 + 3)$$

$$B = 3 \times (-2) + (-7) \times 3 - 3 \times (-4)$$

$$C = (1 - 3)(6 - 10)(1 - 2 - 3)$$

$$D = -1 - (-1 - 1 - 3) - (-1 - 1)(3 - 5)$$

## Exercice n° 2 :

(6 points)



On pose  $x = -3$ ,  $y = 5$  et  $z = -2$ .

Calculer les expressions suivantes en détaillant les étapes.

$$E = (x - y + z)(z - x - y)$$

$$F = (x - y)(x - z)(y - z)$$

$$C = 1 - x - y - z + x + y + z$$

## Exercice n° 3 :

(4 points)



1.a. Tracer un triangle HYT rectangle en Y tel que  $HY = 5,7 \text{ cm}$  et  $YT = 7,6 \text{ cm}$ .

1.b. Calculer la valeur exacte de la longueur HT.

2.a. Tracer un triangle RFG rectangle en G tel que  $GF = 6,6 \text{ cm}$  et  $RF = 11 \text{ cm}$ .

2.b. Calculer la valeur exacte de la longueur GR.


## Exercice n° 4 :

(4 points)



1. Démontrer que  $CB = 76 \text{ mm}$ .

2. Calculer la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième de millimètre près de la longueur DB.



**Exercice n° 1 : Nombres relatifs**

CORRECTION

*Nombres relatifs et priorités opératoires*

Calculer les expressions suivantes en détaillant les étapes.

$$A = (7 - 9 - 13) - (1 - 6 + 3)$$

$$A = (7 - 22) - (4 - 6)$$

$$A = -15 - (-2)$$

$$A = -15 + 2$$

$$\boxed{A = -13}$$

$$B = 3 \times (-2) + (-7) \times 3 - 3 \times (-4)$$

$$B = -6 + (-21) + 12$$

$$B = -27 + 12$$

$$\boxed{B = -15}$$

$$C = (1 - 3)(6 - 10)(1 - 2 - 3)$$

$$C = (-2)(-4)(1 - 5)$$

$$C = 8(-4)$$

$$\boxed{C = -32}$$

$$D = -1 - (-1 - 1 - 3) - (-1 - 1)(3 - 5)$$

$$D = -1 - (-5) - (-2)(-2)$$

$$D = -1 + 5 - 4$$

$$D = -5 + 5$$

$$\boxed{D = 0}$$

**Exercice n° 2 : Nombres relatifs**

CORRECTION

*Nombres relatifs et calcul littéral*

On pose  $x = -3$ ,  $y = 5$  et  $z = -2$ .

Calculer les expressions suivantes en détaillant les étapes.

$$E = (x - y + z)(z - x - y)$$

$$E = (-3 - 5 + (-2))(-2 - (-3) - 5)$$

$$E = (-8 - 2)(-2 + 3 - 5)$$

$$E = -10(-7 + 3)$$

$$E = -10(-4)$$

$$\boxed{E = 40}$$

$$F = (x - y)(x - z)(y - z)$$

$$F = (-3 - 5)(-3 - (-2))(5 - (-2))$$

$$F = (-8)(-3 + 2)(5 + 2)$$

$$F = -8(-1) \times 7$$

$$\boxed{F = 56}$$

$$C = 1 - x - y - z + x + y + z$$

$$C = -1 - (-3) - 5 - (-2) + (-3) + 5 + (-2)$$

$$C = -1 + 3 - 5 + 2 - 3 + 5 - 2$$

$$C = -11 + 10$$

$$C = -1$$




### Exercice n° 3 : Pythagore

CORRECTION

#### *Théorème de Pythagore et tracé géométrique*

1.a. Tracer un triangle HYT rectangle en Y tel que  $HY = 5,7 \text{ cm}$  et  $YT = 7,6 \text{ cm}$ .



1.b. Calculer la valeur exacte de la longueur HT.

Dans le triangle HYT rectangle en Y,  
D'après **le théorème de Pythagore** on a :

$$YH^2 + YT^2 = HT^2$$

$$5,7^2 + 7,6^2 = HT^2$$

$$32,49 + 57,76 = HT^2$$


$$HT^2 = 90,25$$

$$HT = \sqrt{90,25}$$

$$HT = 9,5$$

$$HT = 9,5 \text{ cm}$$

2.a. Tracer un triangle RFG rectangle en G tel que  $GF = 6,6 \text{ cm}$  et  $RF = 11 \text{ cm}$ .



2.b. Calculer la valeur exacte de la longueur GR.

Dans le triangle RFG rectangle en G,  
D'après le **théorème de Pythagore** on a :

$$\begin{aligned} GF^2 + GR^2 &= RF^2 \\ 6,6^2 + GR^2 &= 11^2 \\ 43,56 + GR^2 &= 121 \\ GR^2 &= 121 - 43,56 \\ RF &= \sqrt{77,44} \\ RF &= 8,8 \end{aligned}$$

RF = 8,8 cm



#### Exercice n° 4 : Pythagore

CORRECTION

*Théorème de Pythagore deux fois*

1. Démontrer que  $CB = 76 \text{ mm}$ .

Dans le triangle ABC rectangle en C,  
D'après le **théorème de Pythagore** on a :

$$\begin{aligned} CA^2 + CB^2 &= AB^2 \\ 57^2 + CB^2 &= 95^2 \\ 3249 + CB^2 &= 9025 \\ CB^2 &= 9025 - 3249 \\ CB^2 &= 5776 \\ CB &= \sqrt{5776} \\ CB &= 76 \end{aligned}$$

CB = 76mm

2. Calculer la valeur exacte puis une valeur approchée au dixième de millimètre près de la longueur DB.

Dans le triangle DCB rectangle en C,  
D'après **le théorème de Pythagore** on a :

$$CD^2 + CB^2 = BD^2$$

$$70^2 + 76^2 = BD^2$$

$$4900 + 5776 = BD^2$$

$$BD^2 = 10676$$

$$BD = \sqrt{10676}$$

$$BD \approx 103,3$$

$BD \approx 103,3$  mm au dixième de millimètre près.


# ÉGALITÉ DE PYTHAGORE



## VOCABULAIRE DU TRIANGLE RECTANGLE

Dans un triangle rectangle, l' **hypoténuse** désigne le côté qui n'est pas adjacent à l'angle droit.


L' **hypoténuse** est le plus long côté d'un triangle rectangle.



## THÉORÈME DE PYTHAGORE

SI un triangle est rectangle

ALORS la somme des carrés des mesures des côtés de l'angle droit est égale au carré de la mesure de l'hypoténuse.



SI ABC est rectangle en A

ALORS

$$AB^2 + AC^2 = BC^2$$

## CONTRAPOSÉE DU THÉORÈME DE PYTHAGORE

SI un dans un triangle la somme des carrés des mesures des deux plus petits côtés **n'est pas égale** au carré de la mesure du plus grand côté

ALORS ce triangle n'est pas rectangle.

## RÉCIPROQUE DU THÉORÈME DE PYTHAGORE


SI un dans un triangle la somme des carrés des mesures des deux plus petits côtés **est égale** au carré de la mesure du plus grand côté

ALORS ce triangle est rectangle.

## CALCULER LA MESURE DE L'HYPOTÉNUSE :

Dans le triangle TKR rectangle en R,

D'après le **théorème de Pythagore** on a :



$$RT^2 + RK^2 = TK^2$$

$$5^2 + 4^2 = TK^2$$

$$25 + 16 = TK^2$$

$$TK^2 = 41$$


$$TK = \sqrt{41}$$

$$TK \approx 6,4 \text{ cm}$$

## CALCULER LA MESURE D'UN CÔTÉ DE L'ANGLE DROIT :

Dans le triangle EFG rectangle en F,

D'après le **théorème de Pythagore** on a :



$$FG^2 + FE^2 = GE^2$$

$$4,8^2 + FE^2 = 8^2$$

$$23,04 + FE^2 = 64$$

$$FE^2 = 64 - 23,04$$

$$FE^2 = 40,96$$

$$FE = \sqrt{40,96}$$

$$FE = 6,4 \text{ cm}$$

## DÉMONTRER QU'UN TRIANGLE N'EST PAS RECTANGLE :

NO est le plus grand côté, comparons  $MN^2 + MO^2$  et  $NO^2$

MNO un triangle tel que :

—  $MN = 78 \text{ mm}$

—  $MO = 103 \text{ mm}$

—  $NO = 130 \text{ mm}$

$$MN^2 + MO^2$$

$$78^2 + 103^2$$

$$6084 + 10609$$

$$16693$$

$$NO^2$$

$$130^2$$

$$16900$$

MNO est-il rectangle?

$MN^2 + MO^2 \neq NO^2$ , d'après la **contraposée du théorème de Pythagore** le triangle MNO n'est pas rectangle.

## DÉMONTRER QU'UN TRIANGLE EST RECTANGLE :

LK est le plus grand côté, comparons  $UK^2 + UL^2$  et  $LK^2$

LKU un triangle tel que :

—  $LK = 11,7 \text{ m}$

—  $KU = 10,8 \text{ m}$

—  $LU = 4,5 \text{ m}$

$$UL^2 + UK^2$$

$$4,5^2 + 10,8^2$$

$$20,25 + 116,64$$

$$136,89$$

$$LK^2$$

$$11,7^2$$

$$136,89$$

LKU est-il rectangle?











$UK^2 + UL^2 = LK^2$ , d'après la **réci-proque du théorème de Pythagore** le triangle LKU est rectangle en U.





# Puzzle de Perigal


Ce puzzle a été créé en 1873 par le mathématicien Henry Perigal.


Positionner les 10 pièces sur la figure constituée d'un triangle rectangle et des carrés construits sur chacun de ses côtés.








































### PREMIÈRE PARTIE : les deux puzzles

Sur le document fourni en annexe se trouve deux rectangles quadrillés et les pièces nécessaires pour construire deux puzzles.

Découper les cinq pièces identiques de chaque puzzle et les deux rectangles quadrillés.

Les pièces du puzzle A et du puzzle B permettent de construire la même figure par **deux méthodes différentes**, plus précisément aucune des pièces du puzzle A et du puzzle B ne doivent se situer au même endroit.

À vous de trouver ces deux méthodes puis de coller les pièces sur les rectangles quadrillés une fois votre construction validée.



Que constatez-vous?










### DEUXIÈME PARTIE : comparaison des aires

1. Indiquez la nature géométrique de chacune des pièces de ce puzzle et du modèle.
2. En utilisant pour unité d'aire un carreau du quadrillage, déterminer l'aire du modèle.
3. Déterminer les aires de chacune des pièces du puzzle en utilisant la même unité.
4. En observant chacune des constructions obtenues avec les puzzles, déterminer à nouveau l'aire du grand modèle.
5. Quel paradoxe observe-t-on?

### TROISIÈME PARTIE : démonstration



L'unité de mesure utilisée dans cette partie est la mesure du côté d'un carreau du quadrillage.

1. Calculer la mesure de l'hypoténuse du grand triangle rectangle obtenu après la construction du puzzle.
2. Calculer la mesure de l'hypoténuse de chacune des deux pièces en forme de triangle rectangle du puzzle.
3. Quelle relation devrait-on trouver entre les mesures calculées aux questions 1. et 2..
4. Voyez-vous une explication au paradoxe observé dans la deuxième partie?





PARADOXE — Le puzzle de Lewis Carroll — Correction







**PREMIÈRE PARTIE : les deux puzzles**

Voir page précédente.

**SECONDE PARTIE : comparaison des aires**

1. Il y a deux triangles rectangles, un rectangle et deux hexagones.

2. Le grand triangle rectangle a une base qui mesure 21 carreaux et une hauteur qui mesure 8 carreaux.

$$\text{Aire}(\text{grand triangle rectangle}) = \frac{21 \times 8}{2} = \frac{168}{2} = 84$$

3. En unité d'aire on obtient pour le puzzle :

$$\text{Aire}(\text{petit triangle rectangle}) = \frac{8 \times 3}{2} = \frac{24}{2} = 12$$

$$\text{Aire}(\text{grand triangle rectangle}) = \frac{13 \times 5}{2} = \frac{65}{2} = 32,5$$

$$\text{Aire}(\text{rectangle}) = 8 \times 3 = 24$$

$$\text{Aire}(\text{petit hexagone}) = 7$$

$$\text{Aire}(\text{grand hexagone}) = 8$$

4. On obtient pour l'un des puzzles :

$$\text{Aire}(\text{grand triangle rectangle}) = 32,5 + 12 + 24 + 7 + 8 = 83,5$$

Et pour l'autre :

$$\text{Aire}(\text{grand triangle rectangle}) = 32,5 + 12 + 24 + 7 + 8 + +1 = 84,5$$

5. Nous avons obtenu trois mesures différentes de l'aire avec trois méthodes différentes!!

**TROISIÈME PARTIE : démonstration**

1. La grand triangle rectangle a une base qui mesure 21 et une hauteur de 8.

En utilisant le théorème de Pythagore on obtient :

Comme  $21^2 + 8^2 = 441 + 64 = 505$  son hypoténuse mesure  $\sqrt{505} \approx 22,47$

2. Les deux triangles rectangles du puzzle ont respectivement des côtés de l'angle droit dont les mesures sont :

8 et 3 pour l'un et 13 et 8 pour l'autre.

En utilisant le théorème de Pythagore dans ces deux cas on obtient :

Comme  $8^2 + 3^2 = 64 + 9 = 73$  l'un des hypoténuses mesure  $\sqrt{73} \approx 8,54$

Et  $13^2 + 8^2 = 169 + 64 = 233$  l'autre mesure  $\sqrt{233} \approx 15,26$

3. La somme des mesures des deux hypoténuses des pièces du puzzle devrait être égale à l'hypoténuse du grand triangle rectangle.

Or on constate que  $\sqrt{73} + \sqrt{233} \approx 23,8$

$$\text{Donc } \sqrt{73} + \sqrt{233} > \sqrt{505}$$

4. Le plus court chemin entre deux points est le segment. Nous déduisons des calculs précédents que les deux hypoténuses des triangles des pièces du puzzle ne sont pas alignés avec l'hypoténuse du grand triangle.

Contrairement à ce que nous voyons, les pièces du puzzle proposés ne permettent pas de construire un triangle rectangle.

Les angles des deux pièces en forme de triangle rectangle ne sont pas superposables. C'est invisible à l'oeil nu! Le tracé imparfait et le découpage empêchent d'observer ce décalage!



## LA CONNAISSANCE SCIENTIFIQUE

La **connaissance scientifique** est fondée sur quatre piliers :

— **Premier pilier : La question initiale .**

À l'origine de toute connaissance scientifique se trouve une **question** qui interroge le monde dans lequel nous vivons. Une connaissance est une réponse à une question.

*« Avant tout, il faut savoir poser des problèmes. Et quoi qu'on en dise, dans la vie scientifique, les problèmes ne se posent pas d'eux-mêmes. Pour un esprit scientifique, toute connaissance est une réponse à une question. S'il n'y a pas eu de question, il ne peut y avoir de connaissance scientifique. Rien ne va de soi. Rien n'est donné. Tout est construit. »* — Gaston Bachelard

— **Deuxième pilier : Le réalisme .**

Le monde des idées n'a pas la priorité sur le monde physique. Le monde là dehors existe indépendamment et antérieurement à la perception que j'en ai et aux descriptions que l'on en fait.

— **Troisième pilier : La rationalité .**

Cela consiste à respecter les lois de la logique fournies par les mathématiques. Cela demande également d'accepter seulement les théories les plus économiques en hypothèses de départ.

— **Quatrième pilier : Le matérialisme .**

Les expériences scientifiques n'utilisent que des éléments du monde réel et matériel, cela exclu les définitions immatérielles comme les esprits.

## CROYANCE ET OPINION

### Croyance :

*« La croyance est le processus mental expérimenté par une personne qui adhère à une thèse ou une hypothèse, de façon qu'elle les considère comme vérité, indépendamment des faits, ou de l'absence de faits, confirmant ou infirmant cette thèse ou cette hypothèse. Ainsi, les croyances sont souvent des certitudes sans preuve. »* — Wikipédia

### Opinion :

*« L'opinion est un jugement que l'on porte sur un individu, un être vivant, un phénomène, un fait, un objet ou une chose. Elle peut être considérée comme bonne ou mauvaise. »* — Wikipédia

## BIAIS COGNITIFS

**Je suis le frère de deux aveugles.  
Pourtant, ces deux aveugles ne sont pas mes frères.  
Comment est-ce possible?**

### Biais cognitif :

Ce sont des **heuristiques** ou raccourci mentaux qui nous conduisent presque toujours à porter un faux jugement. Nous utilisons les biais cognitifs lorsque :

- il y a un trop grand nombre d'informations à traiter ;
- nous avons besoin de donner du sens au monde qui nous entoure ;
- nous avons besoin d'agir vite ;
- nous avons besoin de mémoriser les choses pour plus tard.

Voici quatre exemples :

**Biais d'ancrage**

On a tendance à être trop dépendant de la première information entendue ou observée.

**Effet d'entraînement**

La probabilité pour qu'une personne adopte une croyance augmente proportionnellement au nombre de personnes qui ont cette croyance.

**Biais de confirmation**

Tendance à ne porter attention qu'aux informations qui confirment nos opinions.

**Biais de Blind-Spot**

Le fait de ne pas réussir à identifier ses propres biais est un biais en lui-même.

 **POUR LE PROF : Paradoxe du carré manquant — Suite de Fibonacci**

À compléter

---

---

## Notes

---

<sup>1</sup>du latin hypotenusa venant du grec hypoteinousa, c'est le participe présent de hypoteínô qui signifie sous-tendre ou soutenir. Dans la proposition I.19 des Éléments d'Euclide, il est dit que « Dans tout triangle, le plus grand côté est celui opposé au plus grand angle. »

<sup>2</sup>Les nombres (3; 4; 5) forment un triplet Pythagoricien. C'est un triplet primitif au sens où ces trois nombres n'ont pas de diviseurs communs. Voici les triplets primitifs inférieurs à 100

(3; 4; 5) -- (5; 12; 13) -- (8; 15; 17) -- (7; 24; 25) -- (20; 21; 29) -- (12; 35; 37) -- (9; 40; 41) -- (28; 45; 53) -- (11; 60; 61) -- (16; 63; 65) -- (33; 56; 65) -- (48; 55; 73)

<sup>3</sup>Il faut bien sur supposer connu le fait que la fonction racine carrée est croissante. Le raisonnement suivant demanderait d'utiliser la continuité et la stricte croissante de la fonction carrée pour obtenir son inverse et la continuité de la fonction racine. C'est hors de propos en troisième...

